


# Compte-rendu

Sortie botanique #1

20 participants



## Le Bec d'Allier (Cher)

1<sup>er</sup> juin 2024

Sortie botanique du samedi 1<sup>er</sup> juin 2024 dans les pelouses sableuses de l'Espace Naturel Sensible du Bec d'Allier dans le Cher, organisée et animée par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, le Conservatoire d'espaces naturels du Centre-Val de Loire et Nature 18.

Animateurs : Rémi Dupré, Rémi Frioux, Julie Bornes & Viny Henry.

Ce site naturel géré par le Cen Centre-Val de Loire se situe au niveau de la confluence entre la Loire et l'Allier, en limite sud-est du Centre-Val de Loire et à seulement quelques kilomètres à l'ouest de Nevers.

La matinée a été l'occasion de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible de la flore des vastes pelouses sableuses situées au nord du site. Des plantes typiques de ces milieux ligériens ont été observées, comme l'Armoise champêtre aux jeunes feuilles divisées velues cendrées et deux graminées aux longues feuilles fines et rigides d'un vert bleuté, le Corynéphore blanchâtre et la Fétuque à longues feuilles. Des espèces plus discrètes ont été détectées comme la petite Spargoute à cinq étamines, caractérisée par ses graines noires munies d'une large aile blanchâtre, ou la Laïche précoce, d'aspect filiforme. Une mousse, la Frangine élancée, formait localement d'imposants tapis d'un vert jaunâtre. Les chemins, au sol tassé retenant mieux l'humidité, accueillent de minuscules espèces supportant le piétinement comme la Crassule mousse, facilement repérable à sa couleur rouge, ou la Riccie grisâtre, hépa-

tique à thalle sillonné. A la fin de l'excursion, nous découvrons quelques dizaines de pieds d'une belle espèce protégée, en cours de fructification, le Lupin à feuilles étroites. Ce sont ainsi près de 150 espèces de la flore qui ont été observées !!

Après une courte averse, la sortie de l'après-midi, réservée aux botanistes débutants, a démarré au sud du site en se familiarisant tout d'abord avec les plantes invasives, en particulier la Renouée de Bohème, en cours d'éradication, formant encore quelques petits massifs étouffant la végétation naturelle. Sur les pelouses sableuses, quelques espèces du matin ont aussi été observées ainsi qu'une petite plante grasse caractérisée par ses feuilles disposées sur six rangs, l'Orpin à six angles.





Espèces remarquables :

1—L'Armoise champêtre (*Artemisia campestris*), quasi menacé en Centre-Val de Loire — CBNBP/MNHN  
Jordane CORDIER

2—Le Corynéphore blanchâtre (*Corynephorus canescens*) — Rémi DUPRÉ

3—La Laïche précoce (*Carex praecox*) — Rémi DUPRÉ

4—La Crassule mousse (*Crassula tillaea*) — Rémi DUPRÉ

5—La Fétuque à longues feuilles (*Festuca longifolia*) — Rémi DUPRÉ

6—Le Lupin à feuilles étroites (*Lupinus angustifolius*), protégé régional — Rémi DUPRÉ





Espèces (suite):

1—Le Peuplier noir (*Populus nigra*) - Rémi DUPRÉ


2—La Renouée de Bohême (*Reynoutria x-bohemica*), invasive en Centre-Val de Loire – CBNBP/MNHN  
Jordane CORDIER

3—La Scrofulaire des chiens (*Scrophularia canina*) – Rémi DUPRÉ

4—L'Orpin à six angles (*Sedum sexangulare*), vulnérable en Centre-Val de Loire – Rémi DUPRÉ

5—La Riccie grisâtre (*Riccia sorocarpa*) – Alélène PARADIS

6—La Frangine élancée (*Racomitrium elongatum*) - Rémi DUPRÉ





Photos de la sortie : MNHN/CBNBP Rémi DUPRÉ et Anne VILLEMÉY (Cen Centre-Val de Loire)

